Cortinasal® 50/100

SPIRIG HEALTHCARE

OEMéd

Qu'est-ce que Cortinasal et quand est-il utilisé?
Cortinasal contient comme principe actif le budésonide qui fait partie du groupe des corticostéroïdes. Le budésonide exerce une action anti-inflammatoire et est indiqué pour le traitement des rhumes saisonniers et survenant tout au long de l'année (perannuels) de nature allergique ou non allergique, des rhumes des foins et des rhumes non saisonniers. Cortinasal est aussi utilisé pour le traitement des polypes nasaux.

Cortinasal ne peut être utilisé que sur prescription médicale et sous son contrôle permanent.

Quand Cortinasal ne doit-il pas être utilisé?
Cortinasal ne doit pas être utilisé en cas d'hypersensibilité connue au principe actif budésonide ou à l'un des excipients.

À cause du manque d'expérience, Cortinasal ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.

Quelles sont les précautions à observer lors de l'utilisation de Cortinasal?
En cas d'infection nasale due à des virus ou à des champignons, Cortinasal ne doit être utilisé qu'en suivant simultanément un traitement antiviral ou antimycosique.

Si vous souffrez d'une affection du foie ou si vous êtes atteint de tuberculose, il est important que vous en informiez votre médecin.

Les enfants ne peuvent utiliser Cortinasal que sous la surveillance d'un adulte et en respectant les instructions du médecin.

En cas d'utilisation excessive ou prolongée chez l'enfant, on ne peut pas exclure que le traitement puisse provoquer un retard de croissance. C'est pourquoi le médecin surveillera soigneusement la croissance des enfants traités pendant une période prolongée par Cortinasal.

Il faut être prudent en cas de prise concomitante prolongée de certains médicaments destinés au traitement des infections dues à des champignons (par exemple médicaments contenant comme principe actif du kétoconazole).

Veuillez informer votre médecin ou votre pharmacien si vous souffrez d'une autre maladie, vous êtes allergique ou vous prenez ou utilisez déjà d'autres médicaments en usage interne ou externe (même en automédication)!

Cortinasal peut-il être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement?
Cortinasal ne doit être utilisé pendant la grossesse ou l'allaitement que sur ordre explicite du médecin.

Comment utiliser Cortinasal?
Il est recommandé avant la première utilisation, de lire attentivement le mode d'emploi et de suivre exactement les instructions.

Rhinite
Le dosage pour les adultes, les patients âgés et les enfants de plus de 6 ans est habituellement le suivant:

Au début du traitement, 2 nébulisations de Cortinasal 100 le matin dans chaque narine ou 2 nébulisations de Cortinasal 50 deux fois par jour (le matin et le soir) dans chaque narine (correspondant à 400 µg de budésonide par jour).

Dès que vous constatez une amélioration des symptômes, le médecin peut réduire le dosage et vous donner la plus faible dose possible.

Traitement des polypes nasaux
La dose journalière maximale recommandée est de 400 µg, correspondant à l'application d'une pulvérisation de Cortinasal 100 ou de deux pulvérisations de Cortinasal 50 dans chaque narine deux fois par jour (matin et soir). Le traitement est limité à 3 mois.

Ne changez pas de votre propre chef le dosage prescrit. Adressez-vous à votre médecin ou à votre pharmacien si vous estimez que l'efficacité du médicament est trop faible ou au contraire trop forte.

Mode d'emploi
1. Se moucher délicatement le nez.

2. Bien agiter le spray doseur et enlever le capuchon de protection.

3. Tenez le spray doseur verticalement entre les doigts, embout vers le haut.

4. Introduire l'embout nasal dans la narine gauche, puis dans la narine droite. En pressant la tête du spray doseur, libérer le nombre de doses requis sous la forme d'un fin brouillard.

5. Replacer le capuchon de protection.

Remarque importante
Vous vous sentez peut-être déjà mieux pendant la première journée où vous utilisez Cortinasal, mais le plein effet de Cortinasal se fait sentir généralement seulement 2 semaines après le début du traitement. Si vous souffrez d'un rhume des foins, il est recommandé de consulter votre médecin quelques jours avant la saison pollinique, afin de pouvoir commencer à temps le traitement par Cortinasal.

Cortinasal ne soulage pas les symptômes oculaires d'origine allergique. Si vous souffrez de symptômes au niveau des yeux, votre médecin pourra éventuellement vous prescrire un médicament supplémentaire.

Entretien de l'embout nasal
Pour le nettoyage, ôter le capuchon de protection et retirer l'embout nasal du flacon-doseur. Le nettoyage du capuchon protecteur et de l'embout nasal s'effectue à l'eau chaude, additionnée si nécessaire d'un détergent.

Après séchage, remonter l'embout nasal et le capuchon de protection sur le flacon de spray.

Quels effets secondaires Cortinasal peut-il provoquer?
L'utilisation de Cortinasal peut provoquer les effets secondaires suivants:

Dans des cas isolés, on peut parfois noter des irritations nasales.

Occasionnellement peut survenir un léger saignement du nez. Rarement peuvent survenir aussi des irritations de la peau telles qu'éruptions cutanées, prurit ou oedème du visage.

Dans des cas rarissimes, on a constaté l'apparition d'ulcérations de la muqueuse nasale après l'utilisation de Cortinasal.

Si vous observez un quelconque signe de maladie que vous pensez devoir imputer à ce médicament, vous devez en informer votre médecin.

Si vous remarquez d'autres effets secondaires, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

A quoi faut-il encore faire attention?
Conserver Cortinasal à 15–25 ° C et hors de la portée des enfants. Cortinasal ne doit pas geler.

Le capuchon de protection doit être replacé sur le spray doseur après chaque utilisation.

Le médicament ne doit pas être utilisé au-delà de la date figurant après la mention «EXP.» sur le récipient.

Au cas où vous seriez en possession d'un spray doseur Cortinasal périmé, veuillez le rapporter à la pharmacie.

Pour de plus amples renseignements, consultez votre médecin ou votre pharmacien qui disposent d'une information détaillée destinée aux professionnels.

Que contient Cortinasal?
1 nébulisation de Cortinasal 50 ou 100 délivre respectivement 50 µg et. 100 µg de budésonide comme principe actif, du sorbate de potassium (E 202) comme agent conservateur et d'autres excipients.

Numéro d'autorisation
55521 (Swissmedic).

Où obtenez-vous Cortinasal? Quels sont les emballages à disposition sur le marché?
En pharmacie, sur ordonnance médicale.

Cortinasal 50/100: spray doseur de 10 ml, contenant environ 200 doses.

Titulaire de l'autorisation
Spirig HealthCare SA, 4622 Egerkingen.

Cette notice d'emballage a été verifiée pour la dernière fois en ***mars 2007*** par l'autorité de contrôle des médicaments (Swissmedic).

Ce texte a été approuvé par les autorités et sa publication a été officiellement accordée à la société Documed SA.© Copyright 2012 by Documed SA. Toute utilisation et reproduction sans autorisation est illicite. [20.01.2012]